

フレーバーリキッドの容器について


お子様の誤飲を防ぐため、

チャイルドレジスタンス容器※

を採用しています。

※チャイルドレジスタンス容器とは…

お子様が簡単に操作できないような構造を持った容器のこと。別名CR容器。



キャップの取り外し方


キャップを**下に押し込みながら**反時計回りに回す。

キャップの取り付け方

キャップをかぶせて、一番下まで時計回りに回す。

※回し終えた後、念のために反時計回りに回してロックが掛かっていることをご確認ください。

フレーバーリキッドの補充方法



1 ボトルカートリッジの吸い口を回して取り外す。

2 フレーバーリキッドの先端ノズルをボトルカートリッジに挿し込み、リキッドを補充する。

3 ボトルカートリッジの吸い口をしっかりと閉める。

※中心軸の穴を避けて補充してください。

※作業をするときは机などの安定した場所で行ってください。また、ボトルを手で固定するなどしてこぼれないようにご注意ください。

※注入後は吸い口をしっかりとしめてください。

※ボトルカートリッジのメモリ上で**1.6ml以上にならないよう**に注意してください。

⚠ 入れすぎ注意!

- ・フレーバーリキッドを入れ過ぎた場合、吸い口から液体が漏れる可能性があります。
- ・口に液体が入る場合は**本体を下向きにして吸ってください**。口に入った場合、すぐに口をよくすすいでください。

⚠ 使用時の注意・使用期限

- 本製品はTaEco専用ボトルカートリッジへの使用を目的とした製品です。**TaEcoボトルカートリッジ以外へのご使用はお止めください**。本来の目的から外れた用途に使用し、万が一事故があった場合の保証はできません。
- 本製品は内服液ではありませんので、**絶対に飲み込まないでください**。
- 誤って飲んでしまった場合、すぐに口をすすぐなどして処置してください。
- 他社の液体を混入しないでください**。
- まれに成分が沈殿することがありますが、中身に問題はありません。
- ボトルカートリッジにリキッドを入れた後は、なるべく早めにご使用下さい。液体が変質する場合がございますが、**品質には問題ありません**。
- 液体が目に入った場合、速やかに洗い流し、その後専門の医師に相談してください。
- 体に合わないと感じられたときは、ご使用を中止し、医師に相談してください。
- 直射日光、高温多湿の場所を避けて開封後は冷暗所に保管し、**2週間を目安に使い切ってください**。
- ・ご使用後はキャップをきちんと閉めお子様の手の届かない所に保管してください。

⚠ 保管時のご注意

- ・お子様の手の届かない所に保管してください。
- ・容器のキャップをしっかりと閉め、直射日光・高温多湿の場所を避けて保管してください。